

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Berlin
(Vorstand: Prof. Dr. H. Zeiß)

Ueber den Einfluß von Desinfektionsmitteln auf die dehydrierenden Leistungen von Bakterien

Inaugural-Dissertation
sur
Erlangung des
Medizinischen Doktorgrades
an der
Friedrich - Wilhelms - Universität
zu Berlin
vorgelegt von
Ming Yi Hwang
aus Kanton (China)

Tag der Promotion: 20 November 1940.

Druck: Karl und Richard Hoffmann, Charlottenburg, Schillerstr. 44

M 326

Gedruckt mit Genehmigung
der
Medizinischen Fakultät der Universität Berlin
Dekan: Prof. Dr. Kreuz
Referent: Prof. Dr. Ehrismann
Korreferent: Prof. Dr. Zeiß



Meinen lieben Eltern

in Dankbarkeit gewidmet

In den letzten zwanzig Jahren wurde das Stoffwechselproblem von verschiedenen Forschern an den Bakterienfermenten intensiv studiert, nachdem die Farbstofftechnik nach Thunberg ihre Anwendung in der Untersuchung über die dehydrierende und hydrierende Fermentfunktion gefunden hatte. Sie besteht darin, daß unter anaeroben Verhältnissen verschiedene Substrate durch die Fermentwirkung dehydriert und dabei freie H-Atome gebildet werden. Je nachdem, ob das Substrat wirksam oder unwirksam ist, werden mehr oder weniger H-Atome gebildet. Man benutzt als Indikator Farbstoffe, welche freie H-Atome aufnehmen können und durch Reduktion einen anderen Farbton annehmen. Je mehr H gebildet wird, um so schneller schlägt der Farbton um. Auf diese Weise kann die dehydrierende Fermentfunktion sowohl qualitativ als auch quantitativ untersucht werden. Nach langjähriger mühseliger Arbeit in der Hoffnung, durch den Unterschied in der Wirksamkeit verschiedener Substrate bei verschiedenen Bakterienarten differentialdiagnostisch wichtige Hinweise gewinnen zu können, haben wir nun auf diesem Gebiete schon ziemlich viel kennen gelernt und wissen, daß als H-Akzeptor das Methylenblau und als H-Donator unter vielen Substraten das Laktat am besten geeignet ist. Auch die Empfindlichkeit der Bakterienfermente gegen Desinfektionsmittel wurde untersucht, nachdem man festgestellt hatte, daß im Zerfall begriffene und während des Desinfektionsprozesses absterbende Bakterien noch imstande sind, Sauerstoff zu verbrauchen und mehr oder weniger stark dehydrierende Wirkungen zu entfalten.

Quastel stellte fest, daß Coli-Bakterien nach der Abtötung durch Toluol, Aether, Benzol, Chloroform noch die Fähigkeit besitzen, mit Milchsäure und Ameisensäure der Desinfektion großen Widerstand leisten können. Insoweit sind die Ergebnisse übereinstimmend, daß nach der Des-

infektion mit Alkohol und Aether außer Milchsäure und Ameisensäure noch die Bernsteinsäure als H-Donator eine schwache Wirksamkeit beibehalten kann.

Da man bis jetzt nur wenige Versuche mit Desinfektionsmitteln angestellt hat, können wir noch nichts Charakteristisches feststellen. Durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Ehrismann bin ich angeregt worden, die sehr interessanten Erscheinungen weiter zu erforschen.

Bevor ich auf meine Arbeit eingehe, sei an dieser Stelle die Arbeitsmethode kurz geschildert:

Bei meinen Versuchen benutzte ich *Staphylococcus aureus* (Urban) und Diphtheriebakterien, die ich von dem Untersuchungsamt des Hygienischen Instituts erhalten konnte. Zur Weiterzüchtung von Reinkulturen wurden Schrägagarröhrchen verwendet. Um eine genügend große Staphylokokkenmenge für einen Versuch zu gewinnen, wurden die Bakterien von dem Schrägagarröhrchen in einer sterilen physiologischen Kochsalzlösung aufgeschwemmt und auf eine größere Nährmedienmenge, z. B. in Kolleschalen übergossen. Darauf kamen die Kulturen auf 24 Stunden in den Brutschrank bei 37° C. Zur Herstellung von größeren Diphtheriebakterienmengen wurden gleichzeitig mehrere Schrägagarröhrchen beimpft und 48 Stunden in den Brutschrank hineingestellt.

Danach wurden die Bakterien in einer mit Phosphat gepufferten physiologischen Kochsalzlösung von $pH = 7,4$ steril gewaschen und zentrifugiert. Mit den auf diese Weise gewonnenen Bakterien wurden meine experimentellen Versuche angestellt.

Als Desinfektionsmittel wurden Aethylalkohol, Propylalkohol, Butylalkohol, Amylalkohol, Phenol, Chloroform, Aether, Toluol und Sublimat verwendet.

Als H-Donatoren wurden folgende Substrate angewandt:

Na-Laktat,
Na-Formicum,
Na-Succinicum,
Glykokoll,
Alanin,

Glucose,
Maltose,
Weinsaures Natrium,
Zitronensaures Natrium,
Na-Acetat,
Na-Oxalat,
Methylalkohol,
Aethylalkohol,
Formaldehyd,
Formamid,
Acetamid,
Karbamid,
Physiologische Kochsalzlösung (= ohne).

Die Versuche wurden wie folgt ausgeführt:

Ich nahm 2 ccm Methylenblaulösung in der Konzentration von 1:10 000, 2 ccm Substratlösung in der Konzentration von 0,3 Mol, 2 ccm Staphylokokken oder Diphtheriebakterien in einer sterilen mit PO_4 gepufferten physiologischen Kochsalzlösung von $\text{p}_\text{H} = 7,4$ aufgeschwemmt, brachte alles in einem Thunberggröhrchen zusammen und evakuierte an einer Wasserstrahlpumpe. Darauf wurde die Reduktion in einem Wasserbade von 37°C beobachtet. Der Unterschied zwischen dem eigentlichen Versuch und den Vorversuchen besteht darin, daß die Bakterien bei den eigentlichen Versuchen durch Desinfektionsmittel zuerst abgetötet und das Desinfektionsmittel danach durch Zentrifugieren entfernt wurde. Die Desinfektionszeit, in der die Bakterien abgetötet werden sollten, wurde durch Vorversuche bestimmt, indem ich die Bakterien mit den verschiedenen Desinfektionsmitteln in verschiedenen Konzentrationen und verschieden lange behandelte, und ihre Wachstumsfähigkeit durch Beimpfung in Nährbouillon und Bebrütung im Brutschrank prüfte.

Da vorliegende Arbeit im Zusammenhang mit der von Tschen in unserem Institut steht, in der der Einfluß von Desinfektionsmitteln auf Staphylokokken und Colibakterien untersucht wurde, seien der Vollständigkeit wegen noch die Ergebnisse dieser Arbeit hier kurz angegeben,

Er fand:

1. Toluol, Benzol und Aether können die Staphylokokken abtöten, ohne ihre dehydrierende Fermentfunktion dem Laktat und der Ameisensäure gegenüber wesentlich zu schädigen.
2. 30 Vol. %iger Methyl- und Aethylalkohol sind als H-Donatoren unwirksam. 50 Vol. %iger Aethylalkohol tötet die Staphylokokken schon in 5 Minuten, während 50 Vol. %iger Methylalkohol sie erst in 10 Minuten tötet.
Die dehydrierende Fermentfunktion bleibt dem Laktat und der Ameisensäure gegenüber noch erhalten, wenn die Bakterien durch 50—60 Vol. %igen Methyl- oder Aethylalkohol abgetötet werden.
3. Die durch Sublimat abgetöteten Staphylokokken vermögen das Methylenblau nicht mehr zu reduzieren.
4. Die durch Sublimat abgetöteten Colibakterien können in Gegenwart von Laktat als H-Donatoren das Methylenblau nicht mehr reduzieren. Die durch 50 Vol. %igen Aethylalkohol abgetöteten Bakterien können noch eine schwache reduzierende Wirkung entfalten.
5. Die dehydrierende Fermentfunktion der Colibakterien bleibt dem Laktat gegenüber noch gut erhalten, nachdem die Bakterien durch Toluol und Aether abgetötet sind.

Tschen stellte ferner fest, daß die Methylenblaureduktion durch abgetötete Bakterien in Gegenwart von Desinfektionsmitteln ausbleibt.

Aus diesem Grunde habe ich alle Versuche in Abwesenheit von Desinfektionsmitteln ausgeführt. Außerdem habe ich absichtlich eine dichtere Bakterienaufschwemmung gewählt, um zu sehen, ob doch noch manche Substrate als H-Donatoren wirksam sind, die sich bei den Versuchen von Tschen als unwirksam erwiesen haben.

A. Versuche mit Staphylokokken aureus.

1. Versuche mit Propylalkohol.

Nach meinen Versuchen ist, wie Tabelle I zeigt, Propylalkohol als Desinfektionsmittel stärker als Methyl- und Aethylalkohol; denn schon 40 Vol. %iger Propylalkohol ver-

mag die Staphylokokken in 5 Minuten abzutöten. Als H-Donatoren nach der Desinfektion erwiesen sich nur Milchsäure, Ameisensäure und Bernsteinsäure als wirksam (s. Tabelle II).

Die Dauer der Methylenblaureduktion nahm erheblich zu, nachdem die Bakterien mit Desinfektionsmitteln behandelt worden waren, auch wenn die Bakterien noch nicht abgetötet waren. Aus der Tabelle III sieht man, daß die Methylenblaureduktion sogar ausbleibt, obwohl durch den 20 Vol. %igen Propylalkohol die Bakterien noch nicht abgetötet werden konnten. In Bezug auf die Beeinflussung der dehydrierenden Bakterienfermente ist die Konzentration und Wirkungskdauer der Desinfektionsmittel von großer Bedeutung. Die fermentative Wirkung von den Bakterien, die durch eine stärkere Lösung in kürzerer Zeit abgetötet sind, ist viel stärker als die von denjenigen, welche durch eine schwächere Lösung in längerer Zeit abgetötet werden.

Daß die Versuche mit 60 und 70 Vol. %igem Alkohol am 18. und 23. VII. etwas schneller verliefen, war nur der dichteren Aufschwemmung der Bakterien zu verdanken. Vergleicht man die Reduktionszeit der Ameisensäure mit der der Milchsäure, so sieht man, daß die beiden Kurven nicht parallel verlaufen. Dies trifft auch bei den anderen Versuchen zu.

2. Versuche mit Butylalkohol.

Im großen und ganzen hat Butylalkohol dieselbe Wirkung wie Propylalkohol. Hier sieht man wieder die unregelmäßige Widerstandsfähigkeit der Ameisensäure gegen Desinfektion (s. Tabelle IV u. V).

3. Versuche mit Amylalkohol.

Amylalkohol wirkt als Desinfektionsmittel sehr schwach. Er tötet die Staphylokokken erst in einer Stunde. Nach der Desinfektion erweist sich Laktat als sehr wirksam, wenn

man eine sehr dichte Aufschwemmung wählt. Im Gegensatz zu den anderen Alkoholen hat nach der Desinfektion durch Amylalkohol noch eine Reihe anderer Substrate ihre Wirksamkeit als H-Donatoren behalten (s. Tabelle VII).

Bei Wiederholung desselben Versuches mit einer dünneren Aufschwemmung ergab sich ein anderes Resultat (s. Tabelle VIII). Außer Laktat deutete nur noch Maltose eine geringe Wirksamkeit als H-Donator an. Ameisensäure und Bernsteinsäure verloren in diesem Falle auch ihre Wirksamkeit. Die Änderung der Dichte der Bakterienaufschwemmung hatte hierbei eine große Bedeutung, wie die Tabellen VII und VIII veranschaulichen.

4. Versuche mit Phenol.

Die desinfizierende Kraft von Phenol ist außerordentlich stark. Wenn man der Bakterienaufschwemmung ein paar ccm Phenol zugibt, so sieht man, wie schnell sich die Aufschwemmung ändert. Die Bakterien ballen sich zu Klumpen zusammen und schlagen auf dem Boden nieder.

Interessant ist, daß nach der Desinfektion im Gegensatz zu den vorigen Versuchen mit Alkoholen Maltose und Alanin als H-Donatoren wirksam sind.

Laktat, das nach der Desinfektion sonst immer eine relativ starke Wirksamkeit beibehalten kann, erweist sich hier auch als unwirksam.

5. Versuche mit Sublimat.

Tschen hat bei seinen Versuchen festgestellt, daß Sublimat in der Konzentration von 0,1 : 1000 die Staphylokokken in 5 Minuten abtöten kann und danach die Methylenblau-reduktion mit Laktat als H-Donator ausbleibt. Ob andere Substrate als H-Donatoren auch unwirksam sind, hat er seinerzeit nicht festgestellt. Ich wiederholte den Versuch und konnte feststellen, daß im Gegensatz zu seinen Versuchen nach der Desinfektion Laktat doch noch wirksam ist. Das kann daran liegen, daß die Staphylokokken ihren Charakter von Zeit zu Zeit ändern. Man erkennt dies daran, daß die Reduktion durch frische Staphylokokken bei mei-

nen Versuchen viel schneller vor sich ging, als die bei den Versuchen von Tschen. Ferner wählte ich eine sehr dichte Bakterienaufschwemmung, was dabei sicher eine Rolle spielt.

6. Versuche mit Chloroform.

Als Desinfektionsmittel hat Chloroform eine ähnliche Wirkung wie Toluol und Benzol. Es tötet die Bakterien in einer Aufschwemmung schon bei Zimmertemperatur. Die Staphylokokken werden durch Chloroform erst in 192 Stunden abgetötet. Die Wirksamkeit von Laktat als H-Donator ist aber noch nachweisbar.

Kurze Zusammenfassung.

Nach den bisherigen Versuchen konnte festgestellt werden, daß sich im allgemeinen nach der Desinfektion als H-Donator Laktat am besten eignet, ausgenommen bei Phenol. Ferner wurde nachgewiesen, daß die dehydrierenden Fermente durch die längere Einwirkung einer schwachen Desinfektionsmittellösung stärker geschädigt werden als durch eine starke Lösung in kürzerer Zeit (s. Tabelle III).

B. Versuche mit Diphtheriebakterien

Bisher wurde nach der Desinfektion die Fermentfunktion außer von Staphylokokken am meisten noch von den Coli-Bakterien untersucht. Es wurde aber festgestellt, daß die Bakterienfermente nach der Desinfektion ziemlich stark zerstört werden. Ich untersuchte daher eine andere Bakterienart, die eine stärkere Virulenz besitzt, nämlich: die Diphtheriebakterien.

Wegen der Schwierigkeit der Herstellung von großen Bakterienmengen habe ich die Versuche wie folgt ausgeführt:

Nach der Feststellung der Desinfektionszeit und der optimalen Konzentration der Desinfektionsmittel werden mehrere Substrate auf ihre Wirksamkeit nach der Desin-

fektion gleichzeitig untersucht. Wo eine Reduktion stattfindet, wird auch die Reduktion durch frische Bakterien untersucht. Genau so wie die Colibakterien geben die Diphtheriebakterien unbefriedigende Ergebnisse.

Sowohl nach der Desinfektion mit 100 %igem Methylalkohol in 30 Minuten als auch nach der Desinfektion mit 60 Vol. %igem Propylalkohol in 30 Minuten oder mit einer 1 %igen Sublimatlösung erweisen sich sämtliche Substrate als unwirksam (s. Tabelle XII, XIII, XVII).

Nach der Abtötung durch 100 Vol. %igem Ämylalkohol ist als H-Donator Na-Succinicum das wirksamste Substrat, während das sonst immer sehr wirksame Na-Laktat an zweiter Stelle steht. Ferner deutet Maltose noch eine relativ schwache Wirksamkeit an (s. Tabelle XIV).

Auch die Diphtheriebakterien werden durch Toluol erst nach längerer Zeit abgetötet. Sie verlieren im Gegensatz zu den Staphylokokken ihre dehydrierende Fermentfunktion nach der Desinfektion durch Toluol (s. Tabelle XVI).

Nach den Resultaten der bisherigen Untersuchungen ergibt sich, daß Ameisensäure, die bei der Methylenblaureduktion durch abgetötete Staphylokokken fast immer genau so wirksam wie Milchsäure ist, bei der Methylenblaureduktion durch abgetötete Diphtheriebakterien ihre Wirksamkeit als H-Donator vollständig verliert. Die Bernsteinsäure ist, wenn sich nach der Desinfektion überhaupt noch eine dehydrierende Fermentfunktion bemerkbar macht, noch relativ wirksam.

Auch die Wirksamkeit der Maltose ist beachtenswert. Sie ist bei den Diphtheriebakterien relativ wirksamer als bei den Staphylokokken.

Tabelle I: Staphylokokken, 24 Stunden alt, werden durch Propylalkohol in verschiedenen Konzentrationen und verschieden lange desinfiziert. Nach der Desinfektion wird das betreffende Desinfektionsmittel durch NaCl-Lösung verdünnt und durch 15 Minuten langes Zentrifugieren entfernt.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Konzentra- tion	Wirkungs- dauer in Minuten	Wachs- tum	Reduktions- zeit in Minuten	Reduktion durch frische Bakterien in Minuten
Desinfektion mit Propylalkohol							
12. 36	1936	Ohne	30 Vol. %	5	++	∞	16,5
"	"	Na-Laktat	30 "	5	++	13,2	1
"	"	Na-Formicicum	30 "	5	++	23,5	2,5
1. 37	3872	Ohne	40 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	40 "	5	—	38	1
"	"	Na-Formicicum	40 "	5	—	48	1,5
12. 36	1936	Ohne	50 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	50 "	5	—	17	1
"	"	Na-Formicicum	50 "	5	—	71	2,5
12. 36	7480	Ohne	60 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	60 "	5	—	20	1
"	"	Na-Formicicum	60 "	5	—	30	2,5
12. 36	5016	Ohne	70 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	70 "	5	—	24	1
"	"	Na-Formicicum	70 "	5	—	25	2,5
1. 37	3872	Ohne	80 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	80 "	5	—	29	1
"	"	Na-Formicicum	80 "	5	—	57	2,5
"	"	Ohne	100 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	100 "	5	—	29	1
"	"	Na-Formicicum	100 "	5	—	57	2,5

Tabelle II: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 30 Vol. %ig. Propylalkohol in 5 Minuten
11. 12. 36	1936	Ohne	17 Min	∞ Min.
11. 12. 36	1936	Na-Laktat	1 „	13 „
11. 12. 36	1936	Na-Formicicum	2,5 „	23 „
11. 12. 36	1936	Na-Succinicum	10,5 „	28 „
11. 12. 36	1936	Glykokoll	6 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Alanin	4 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Glukose	2 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Maltose	3 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Weins. Natr.	3 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Zitronens. Natr.	3 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Na-Acetat	11 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Na-Oxalat	8 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Methylalkohol	14 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Aethylalkohol	9 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Propylalkohol	5 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Formaldehyd	5 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Formamid	10,5 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Acetamid	26 „	∞ „
11. 12. 36	1936	Karbamid	13 „	∞ „

Tabelle III: Versuch am 30. 12. 1936.

Keimzahl: 10032 Mill./ccm.

Substrat 0,1 Mol.	Desinfektion mit Propylalkohol			
	Konzentra- tion	Wirkungs- dauer in Minuten	Reduktions- zeit in Minuten	Wachs- tum
Ohne	Ohne	0	21,5	+
Na-Laktat	„	0	1,5	+
Na-Formicicum	„	0	3,0	+
Ohne	20 Vol. %	0	∞	+
Na-Laktat	„	0	2,5	+
Na-Formicicum	„	0	7	+
Ohne	„	15	∞	+
Na-Laktat	„	15	33	+
Na-Formicicum	„	15	∞	+
Ohne	„	30	∞	+
Na-Laktat	„	30	29	+
Na-Formicicum	„	30	∞	+
Ohne	„	60	∞	+
Na-Laktat	„	60	∞	+
Na-Formicicum	„	60	∞	+

Tabelle IV: Staphylokokken, 24 Stunden alt, werden durch Butylalkohol in verschiedenen Konzentrationen und verschieden lange desinfiziert. Nach der Desinfektion wird das betreffende Desinfektionsmittel durch NaCl-Lösung verdünnt und durch 15 Minuten langes Zentrifugieren entfernt.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Konzentra- tion	Wirkungs- dauer in Minuten	Wachs- tum	Reduktions- zeit in Minuten	Reduktion durch frische Bakterien in Minuten
Desinfektion mit Butylalkohol.							
16. 12. 36	8712	Ohne	30 Vol. %	5	+++	∞	16
"	"	Na-Laktat	30 "	5	+++	7	1
"	"	Na-Formicicum	30 "	5	+++	22	2,5
"	"	Ohne	40 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	40 "	5	—	6	1
"	"	Na-Formicicum	40 "	5	—	9	2,5
"	"	Ohne	50 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	50 "	5	—	11	1
"	"	Na-Formicicum	50 "	5	—	14	2,5
23. 12. 36	5016	Ohne	60 Vol. %	5	—	∞	16
"	"	Na-Laktat	60 "	5	—	16	1
"	"	Na-Formicicum	60 "	5	—	26	2,5
"	"	Ohne	70 Vol. %	5	—	∞	21,5
"	"	Na-Laktat	70 "	5	—	38	1,5
"	"	Na-Formicicum	70 "	5	—	75	3
28. 12. 36	10692	Ohne	80 Vol. %	5	—	∞	21,5
"	"	Na-Laktat	80 "	5	—	32	1,5
"	"	Na-Formicicum	80 "	5	—	75	3
"	"	Ohne	100 Vol. %	5	—	∞	21,5
"	"	Na-Laktat	100 "	5	—	29	1,5
"	"	Na-Formicicum	100 "	5	—	93	3

Tabelle V: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Keimzahl in Mill./c1m	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 50 Vol. %ig. Butylalkohol in 5 Minuten
11. 12. 36	1936	Ohne	17 Min	∞ Min.
11. 12. 36	1936	Na-Laktat	1 "	13 "
11. 12. 36	1936	Na-Formicicum	2,5 "	23 "
11. 12. 36	1936	Na-Succinicum	10,5 "	28 "
11. 12. 36	1936	Glykokoll	6 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Alanin	4 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Glukose	2 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Maltose	3 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Weins. Natr.		∞ "
11. 12. 36	1936	Zitronens. Natr.		∞ "
11. 12. 36	1936	Na-Acetat	11 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Na-Oxalat	8 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Methylalkohol	14 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Aethylalkohol	9 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Propylalcohol	5 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Formaldehyd	5 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Formamid	10,5 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Acetamid	26 "	∞ "
11. 12. 36	1936	Karbamid	13 "	∞ "

Tabelle VI: Staphylokokken, 24 Stunden alt, werden durch Amylalkohol in verschiedenen Konzentrationen und verschieden lange desinfiziert. Nach der Desinfektion wird das betreffende Desinfektionsmittel mit NaCl-Lösung verdünnt und durch 15 Minuten langes Zentrifugieren entfernt.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Konzentra- tion	Wirkungs- dauer in Minuten	Wachs- tum	Reduktions- zeit in Minuten	Reduktion durch frische Bakterien in Minuten
Desinfektion mit Amylalkohol.							
1. 37	9504	Ohne	60 Vol. %	30	++	∞	13
"	"	Na-Laktat	60 "	30	++	18	1,5
"	"	Na-Formicicum	60 "	30	++	∞	2
"	"	Ohne	80 Vol. %	30	++	∞	13
"	"	Na-Laktat	80 "	30	++	3	1,5
"	"	Na-Formicicum	80 "	30	++	∞	2
"	"	Ohne	100 Vol. %	30	++	∞	13
"	"	Na-Laktat	100 "	30	++	2,5	1,5
"	"	Na-Formicicum	100 "	30	++	∞	2
2. 37	200	Ohne	60 Vol. %	30	—	∞	25
"	"	Na-Laktat	60 "	30	—	∞	1,5
"	"	Na-Formicicum	60 "	30	—	∞	2
"	"	Ohne	80 Vol. %	30	—	∞	25
"	"	Na-Laktat	80 "	30	—	13	1,5
"	"	Na-Formicicum	80 "	30	—	∞	2
"	"	Ohne	100 Vol. %	30	—	∞	25
"	"	Na-Laktat	100 "	30	—	∞	1,5
"	"	Na-Formicicum	100 "	30	—	∞	2

Tabelle VII: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 60 Vol. 0/0ig. Amylalkohol in 60 Minuten
4. 3. 37	7760	Ohne	9 Min.	∞ Min.
4. 3. 37	7760	Na-Laktat	1 "	2 "
4. 3. 37	7760	Na-Formicicum	1 "	2 "
4. 3. 37	7760	Na-Succinicum	10,5 "	4 "
4. 3. 37	7760	Glykokoll	1 "	110 "
4. 3. 37	7760	Alanin	2 "	52 "
4. 3. 37	7760	Glukose	1,5 "	38 "
4. 3. 37	7760	Maltose	2 "	42 "
4. 3. 37	7760	Weins. Natr.		∞ "
4. 3. 37	7760	Zitronens. Natr.		∞ "
4. 3. 37	7760	Na-Acetat	11 "	∞ "
4. 3. 37	7760	Na-Oxalat	8 "	∞ "
4. 3. 37	7760	Methylalkohol	5 "	50 "
4. 3. 37	7760	Aethylalkohol	9 "	∞ "
4. 3. 37	7760	Propylalkohol	2 "	74 "
4. 3. 37	7760	Fomaldehyd	10 "	∞ "
4. 3. 37	7760	Formamid	1 "	90 "
4. 3. 37	7760	Acetamid	26 "	∞ "
4. 3. 37	7760	Karbamid	13 "	∞ "

Tabelle VIII: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 60 Vol.-%ig. Amylalkohol in 60 Minuten
17. 3. 37	368	Ohne	36 Min.	∞ Min.
17. 3. 37	368	Na-Laktat	1,5 "	7 "
17. 3. 37	368	Na-Formicicum	2,5 "	∞ "
17. 3. 37	368	Na-Succinicum	15 "	∞ "
17. 3. 37	368	Glykokoll	6 "	∞ "
17. 3. 37	368	Alanin	4 "	∞ "
17. 3. 37	368	Glukose	2 "	∞ "
17. 3. 37	368	Maltose	3 "	185 "
17. 3. 37	368	Weins. Natr.		∞ "
17. 3. 37	368	Zitronens. Natr.		∞ "
17. 3. 37	368	Na-Acetat	11 "	∞ "
17. 3. 37	368	Na-Oxalat	8 "	∞ "
17. 3. 37	368	Methylalkohol	14 "	∞ "
17. 3. 37	368	Aethylalkohol	9 "	∞ "
17. 3. 37	368	Propylalkohol	5 "	∞ "
17. 3. 37	368	Formaldehyd	5 "	∞ "
17. 3. 37	368	Formamid	10,5 "	∞ "
17. 3. 37	368	Acetamid	26 "	∞ "
17. 3. 37	368	Karbamid	13 "	∞ "

Tabelle IX: Staphylokokkus aureus Urban.

Keimzahl: 7040 Mill./ccm

Versuch am: 27. 1. 1937

Substrat	Reduktion vor der Desinfektion in Minuten	Reduktion nach der Desinfektion 5 Minuten lang mit 10 Vol. %ig. Phenol in Minuten
Maltose	2,5	40
Glukose	2	∞
Alanin	3,5	85
Glykokoll	6	∞
Ohne	9	∞
Na-Laktat	2	∞
Na-Formicicum	2	∞
Na-Succinicum	10,5	∞
Weins. Natrium		
Zitronens. Natrium		
Na-Acetate	11	∞
Na-Oxalat	8	∞
Methylalkohol	10	∞
Propylalkohol	5	∞
Aethylalkohol	9	∞
Formaldehyd	5	∞
Formamid	10,5	∞
Acetamid	26	∞
Karmamid	13	∞

Tabelle X: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 1: 1000 Sub- limat in 5 Min.
22. 3. 37	5390	Ohne	54 Min.	∞ Min.
22. 3. 37	5390	Na-Laktat	1,5 "	10 "
22. 3. 37	5390	Na-Formicicum	2 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Na-Succinicum	10,5 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Glykokoll	6 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Alanin	7 "	32 "
22. 3. 37	5390	Glukose	2 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Maltose	3 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Weins. Natr.		
22. 3. 37	5390	Zitronens. Natr.		
22. 3. 37	5390	Na-Acetat	11 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Na-Oxalat	8 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Methylalkohol	14 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Aethylalkohol	9 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Propylalkohol	5 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Formaldehyd	5 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Formamid	10,5 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Acetamid	26 "	∞ "
22. 3. 37	5390	Karbamid	13 "	∞ "

Tabelle XI: Staphylokokkus aureus Urban.

Datum	Stunden nach der Desinfektion mit Chloroform	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion		Wachs- tum
			mit Chlo- roform in Min.	ohne chlo- roform in Min.	
26. 1. 37	0 h	NaCl		33	+
26. 1. 37	0 h	Na-Laktat	2	3	+
26. 1. 37	1 h	NaCl			+
26. 1. 37	1 h	Laktat	2		+
27. 1. 37	24 h	NaCl	∞	∞	+
27. 1. 37	24 h	Laktat	3	5	+
28. 1. 37	48 h	NaCl	∞	∞	+
28. 1. 37	48 h	Laktat	5,5	7,5	+
29. 1. 37	62 h	NaCl	∞	∞	+
29. 1. 37	62 h	Laktat	7	12	+
3. 2. 37	192 h	NaCl	∞	∞	—
3. 2. 37	192 h	Laktat	64	∞	—

Tabelle XII: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 100 Vol. %ig. Methylalkohol in 30 Minuten	
13. 3. 37	1048	Ohne	11,5 Min.	∞	Min.
13. 3. 37	1048	Na-Laktat	4 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Na-Formicicum	7 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Na-Succinicum	9 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Glykokoll	10 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Alanin	10 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Glukose	6 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Maltose	6 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Weins. Natr.	15 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Zitronens. Natr.	27 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Na-Acetat	9 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Na-Oxalat	12 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Methylalkohol	12 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Aethylalkohol	3 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Propylalkohol	4 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Formaldehyd	10 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Formamid	11 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Acetamid	20 "	∞	"
13. 3. 37	1048	Karbamid	5 "	∞	"

Tabelle XIII: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 60 Vol. %ig. Propylalkohol in 30 Minuten
1. 3. 37	1048	Ohne	11 Min.	∞ Min.
1. 3. 37	1048	Na-Laktat	3,5 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Na-Formicicum	9 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Na-Succinicum	9 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Glykokoll	10 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Alanin	10 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Glukose	6 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Maltose	6 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Weins. Natr.	15 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Zitronens. Natr.	27 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Na-Acetat	9 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Na-Oxalat	12 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Methylalkohol	12 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Aethylalkohol	3 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Propylalkohol	4 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Formaldehyd	10 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Formamid	11 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Acetamid	20 "	∞ "
1. 3. 37	1048	Karbamid	5 "	∞ "

Tabelle XIV: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./c ₁ m	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 100 Vol.-%ig. Amylalkohol in 30 Minuten
13. 3. 37	1048	Ohne	11,5 Min.	∞ Min.
13. 3. 37	1048	Na-Laktat	4 "	78 "
13. 3. 37	1048	Na-Formicicum	7 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Na-Succinicum	9 "	45 "
13. 3. 37	1048	Glykokoll	10 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Alanin	10 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Glukose	6 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Maltose	6,5 "	102 "
13. 3. 37	1048	Weins. Natr.	15 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Zitronens. Natr.	27 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Na-Acetaf	9 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Na-Oxalat	12 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Methylalkohol	12 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Aethylalkohol	3 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Propylalkohol	4 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Formaldehyd	10 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Formamid	11 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Acetamid	20 "	∞ "
13. 3. 37	1048	Karbamid	5 "	∞ "

Tabelle XV: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 10 Vol. %ig. Chloroform in 30 Minuten
9. 3. 37	7040	Ohne	16 Min.	∞ Min.
9. 3. 37	7040	Na-Laktat	4,5 "	17 "
9. 3. 37	7040	Na-Formicicum	13 "	∞ "
9. 3. 37	7040	Na-Succinicum	17 "	33 "
9. 3. 37	7040	Glykokoll		
9. 3. 37	7040	Alanin		
9. 3. 37	7040	Glukose		
9. 3. 37	7040	Maltose	6 "	150 "
9. 3. 37	7040	Weins, Natrium		
9. 3. 37	7040	Zitronens, Natr.		
9. 3. 37	7040	Methylalkohol		
9. 3. 37	7040	Aethylalkohol		
9. 3. 37	7040	Propylalkohol		
9. 3. 37	7040	Formaldehyd		
9. 3. 37	7040	Acetamid		
9. 3. 37	7040	Karbamid		
9. 3. 37	7040	Na-Acetat		
9. 3. 37	7040	Na-Oxalat		

Tabelle XVI: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 10 Vol.-%ig. Toluol in 144 Std.
15. 3. 37	7040	Ohne	13 Min.	∞ Min.
15. 3. 37	7040	Na-Laktat	5 "	∞ "
15. 3. 37	7040	Na-Formicicum	10,5 "	∞ "
15. 3. 37	7040	Na-Succinicum	12 "	∞ "
15. 3. 37	7040	Glykokoll		
15. 3. 37	7040	Alanin		
15. 3. 37	7040	Glukose		
15. 3. 37	7040	Maltose		
15. 3. 37	7040	Weins. Natrium		
15. 3. 37	7040	Zitronens. Natr.		
15. 3. 37	7040	Na-Acetat		
15. 3. 37	7040	Na-Oxalat		
15. 3. 37	7040	Methylalkohol		
15. 3. 37	7040	Aethylalkohol		
15. 3. 37	7040	Propylalkohol		
15. 3. 37	7040	Formaldehyd		
15. 3. 37	7040	Formamid		
15. 3. 37	7040	Acetamid		
15. 3. 37	7040	Karbamid		

Tabelle XVII: Diphtheriebakterien.

Datum	Keimzahl in Mill./ccm	Substrat 0,1 Mol.	Reduktion durch frische Bakterien	Reduktion nach der Desinfektion durch 1: 1000 Sub- limat in 5 Min.
30. 3. 37	7760	Ohne	30 Min.	∞ Min.
30. 3. 37	7760	Na-Laktat	6 "	∞ "
30. 3. 37	7760	Na-Formicum	22 "	∞ "
30. 3. 37	7760	Na-Succinicum		
30. 3. 37	7760	Glykokoll		
30. 3. 37	7760	Alanin		
30. 3. 37	7760	Glukose		
30. 3. 37	7760	Maltose		
30. 3. 37	7760	Weins, Natrium		
30. 3. 37	7760	Zitronens, Natr.		
30. 3. 37	7760	Na-Acetate		
30. 3. 37	7760	Na-Oxalat		
30. 3. 37	7760	Methylalkohol		
30. 3. 37	7760	Aethylalkohol		
30. 3. 37	7760	Propylalkohol		
30. 3. 37	7760	Formaldehyd		
30. 3. 37	7760	Formamid		
30. 3. 37	7760	Acetamid		
30. 3. 37	7760	Karbamid		

Nach der Desinfektion noch wirksame H-Donatoren.
(Versuche zusammen mit Herrn Tschen)

Desinfektions- mittel	Staphylokokken	Diphtherie- bakterien	Coli- bakterien
Methylalkohol	Na-Formicicum Na-Laktat	—	
Aethylalkohol	Na-Laktat Na-Formicicum Na-Succinicum		Na-Laktat
Propylalkohol	Na-Laktat Na-Formicicum Na-Succinicum	—	
Buthylalkohol	Na-Laktat Na-Formicicum Na-Succinicum		
Amylalkohol	a) Keimzahl 368 Mill./ccm		
	Na-Laktat		
	Maltose		
	b) Keimzahl 7760 Mill./ccm		
	Na-Laktat		
	Na-Formicicum		
	Na-Succinicum	Na-Succinicum	
	Glukose	Na-Laktat	
	Maltose	Maltose	
	Methylalkohol		
	Alanin		
	Propylalkohol		
Phenol	Maltose		
	Alanin		
Sublimat	Na-Laktat Alanin	—	—

Desinfektions- mittel	Staphylokokken	Diphtherie- bakterien	Coli- bakterien
Aether	Na-Laktat Na-Formicicum		Na-Laktat Na-Formicicum
Chloroform	Na-Laktat	Na-Laktat Na-Succinicum Maltose	Milchsäure Glycerophosphor- säure Ameisensäure Essigsäure Buttersäure
Toluol	Na-Laktat Na-Formicicum Na-Succinicum	—	Ameisensäure Essigsäure Buttersäure Glycerophosphor- säure Milchsäure Bernsteinsäure Hydroxydbutter- säure
Benzol	Na-Laktat		

Nach Versuchen der vorliegenden Arbeit sowie derjenigen von
Herrn Tschen.

Am Schluß dieser Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht Herrn Prof. Dr. Zeiss für die gütige Unterstützung, die er mir durch die zur Verfügung gestellten zahlreichen Instrumente und Materialien des Instituts gewährte, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ebenfalls bin ich Herrn Prof. Dr. Ehrismann für die Anregung zu dieser Arbeit sehr dankbar.

Literaturverzeichnis.

1. Hailer: Die Desinfektion aus dem Weyl'schen Handbuch der Hygiene, 4. Abt. Bd. 8.
2. Quastel: The Biochemical Journal 148, Bd. 21. 1927.
3. Ehrismann, O.: Z. f. Hygiene 273, Bd. 115, 1933.
4. Wirgin: Z. f. Hygiene 46, Bd. 149, 1904.
5. Warburg: Pfl. Arch., 144, 465, 1912.
6. Braun, H.: Zbl. Bakter. I, orig. 105, Bd. 127, 1933.
7. Euler, H. und Euler, B.: Fermentforschung I, 465, 1916.
8. Quastel: Ergebnisse der Enzymforschung, Bd. I, 209, 1932.
9. Quastel: The Biochemical Journal 1224, Bd. 21, 1927.
10. Ehrismann, O.: Ueber die reduzierenden Wirkungen der Diphtherie-bakterien, Zentralbl. f. Bakt. I. Abt. 135. Bd., H. 1/3.

Lebenslauf.

Ich, Ming Yi Hwang wurde am 17. September 1910 als Sohn des Kaufmanns Pack Wai Hwang und seiner Ehefrau Shuk Hing, geborene Chiu in Kanton, Süd-China, geboren.

Nach Beendigung meiner sechsjährigen Volksschulausbildung besuchte ich das Kao-Dschung Gymnasium in Kanton, wo ich im Jahre 1929 das Reifezeugnis erwarb.

Von 1930—1932 studierte ich an der Mandschurischen medizinischen Universität zu Mukden, Nord-China, wo Vorlesungen und Uebungen in japanischer Sprache durch japanische Professoren gehalten werden. Infolge des Kriegsausbruches zwischen China und Japan habe ich freiwillig die dortige Universität verlassen.

Darauf studierte ich an der staatlichen Tung-Chi-Universität zu Schanghai vier Semester Medizin; abermals unterbrach ich des Kriegszustandes wegen in Schanghai mein medizinisches Studium und kam im Herbst 1933 nach Deutschland und setzte mein medizinisches Studium an der Universität Heidelberg fort; dort legte ich 1935 die ärztliche Vorprüfung im naturwissenschaftlichen Abschnitt und im anatomisch-physiologischen Abschnitt ab. Danach studierte ich ein klinisches Semester an derselben Universität. Im Jahre 1936 kam ich nach der Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin, wo ich sechs klinische Semester verbrachte und anschließend die ärztliche Staatsprüfung bestand.

Während der Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen, Kliniken und Kurse bei folgenden Professoren: Zeiss, Kreuz, Sauerbruch, Heubner, v. Bergmann, Siebeck, Friebös, v. Eicken, v. Domarus, Bessau, Rössle, Stoeckel, Waldeyer, Müller-Heß u. a., derer ich an dieser Stelle in Dankbarkeit und Verehrung gedenke.